FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL

GOVERNO DA Bahia | Secretaria da Saúde
TERRA DE TODOS NÓS

HGPV
HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES



Coordenação Municipal DST/AIDS

ANTICONCEPÇÃO DE EMERGÊNCIA:

LEVONORGESTREL (PRIMEIRA ESCOLHA) 0,75mg de levonorgestrel/por comprimido

2 comprimidos VO dose única ou 1 comprimido VO a cada 12 horas

MÉTODO DE YUZPE (SEGUNDA ESCOLHA)

AHOC com 50µg de etinil-estradiol e 250µg de levonorgestrel/por comprimido

2 comprimidos VO a cada 12 horas ou 4 comprimidos VO dose única

AHOC com 30µg de etinil-estradiol e 150µg de levonorgestrel/por comprimido

4 comprimidos VO a cada 12 horas ou 8 comprimidos VO dose única

AHOC = Anticoncepcional Hormonal Oral Combinado µg = microgramas

PROFILAXIA DAS DST NÃO VIRAIS EM MULHERES ADULTAS E ADOLESCENTES COM MAIS DE 45 Kg NÃO GESTANTES

Penicilina G Benzatina Profilaxia da sífilis	2,4 Milhões UI (1,2 Milhões de UI em cada nádega)	IM	Dose Única
Ofloxacina Profilaxia da Gonorréia	400 mg	VO	Dose Única
Azitromicina Profilaxia da Clamidiose e do Cancro Mole	1 g	VO	Dose Única
Metronidazol Profilaxia da Tricomoníase	2 g	VO	Dose Única

PROFILAXIA DAS DST NÃO VIRAIS EM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E GESTANTES COM MENOS DE 45 Kg

Penicilina G Benzatina	Crianças e Adolescentes	50 mil UI/Kg Dose Máxima: 2,4 Milhões UI	IM	Dose Única
	Gestantes	2,4 Milhões UI (1,2 Milhões de UI em cada nádega)		
Ceftriaxona	Crianças e Adolescentes	250 mg	IM	Dose Única
	Gestantes	500 mg		
Azitromicina	Crianças e Adolescentes	20 mg/Kg	VO	Dose Única
	Gestantes	1 g		
Metronidazol	Crianças e Adolescentes	15 mg/Kg/dia	VO	Dose Única
	Gestantes	2 g		

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL

GOVERNO DA Bahia | Secretaria da Saúde
TERRA DE TODOS NÓS

HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES

ALTERNATIVAS PARA A PROFILAXIA DAS DST NÃO VIRAIS			
PROFILAXIA	**GESTANTES**	**CRIANÇAS E ADOLESCENTES**	**ADULTOS**
Penicilina G Benzatina (sífilis)	Estearato de Eritromicina 500mg de 6 / 6 horas durante 15 dias	Estearato de Eritromicina 50mg/Kg/dia de 6 / 6 horas durante 15 dias	Estearato de Eritromicina 500mg de 6 / 6 horas durante 15 dias
Ofloxacina (gonorréia)	Ceftriaxona 500 mg IM dose única	Ceftriaxona 250 mg IM dose única	Ceftriaxona 250 mg IM dose única Tiafenicol 2,5 g VO dose única
Azitromicina (clamidíase)	Estearato de Eritromicina 500mg de 6 / 6 horas durante 7 dias	Estearato de Eritromicina 50mg/Kg/dia de 6 / 6 horas durante 10 a 14 dias	Amoxicilina 500 mg VO de 8/8 horas durante 7 dias
Azitromicina (cancro mole)	Ceftriaxona 250 mg IM dose única Estearato de Eritromicina 500mg de 6 / 6 horas durante 7 dias	Ceftriaxona 125 mg IM dose única	Ceftriaxona 250 mg IM dose única
Metronidazol (tricomoníase)	Secnidazol 2 g VO dose única Tinidazol 2 g VO dose única		Secnidazol 2 g VO dose única Tinidazol 2 g VO dose única

PROFILAXIA DO HIV PARA MULHERES ADULTAS, ADOLESCENTES E GESTANTES				
OPÇÃO - 1	BIOVIR (Zidovudina 300mg + Lamivudina 150 mg)	1 Comprimido	VO	12 / 12 horas
	KALETRA (Lopinavir 200mg + Ritonavir 50mg)	2 Comprimidos		
OPÇÃO - 2	BIOVIR (Zidovudina 300mg + Lamivudina 150 mg)	1 Comprimido	VO	12 / 12 horas
	INDINAVIR 400mg	2 Comprimidos		8 / 8 horas
OPÇÃO - 3	BIOVIR (Zidovudina 300mg + Lamivudina 150 mg)	1 Comprimido	VO	12 / 12 horas
	INDINAVIR 400mg	2 Comprimidos		
	RITONAVIR 100mg	1 Comprimido		